

# ФИТОЛИЗИН PRENATAL

## Инструкция по применению биологически активной добавки к пище

ФИТОЛИЗИН PRENATAL – биологически активная добавка к пище, является дополнительным источником проантоцианидинов и витамина С.

**Форма выпуска:** мягкие капсулы массой 840 мг.

**Состав:** среднецепочечные триглицериды; экстракт плодов клюквы крупноплодной (*Vaccinium macrocarpon*) (25:1); оболочка капсулы (желатин (свиной) пищевой, глицерол (влагоудерживающий агент), вода очищенная, титана диоксид (E171) (краситель), железа оксид красный (E172) (краситель)); лецитин соевый (эмульгатор); L-аскорбиновая кислота; кремния диоксид коллоидный (E551) (стабилизатор).

Биологически активные вещества	Содержание в суточной дозе (1-3 капсулы), мг	% от уровня потребления в сутки
Проантоцианидины	5,5-16,5	5,5-16,5**
Витамин С	не более 20-60	не более 33,3-100*

\* - от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

\*\* - от адекватного уровня потребления в сутки согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5).

### Область применения

В качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника проантоцианидинов и витамина С.

Экстракт плодов клюквы крупноплодной (*Vaccinium macrocarpon*) (25:1), стандартизованный по содержанию проантоцианидинов, способствует поддержанию функционального состояния мочеполовой системы путем облегчения выведения из мочевыводящих путей бактерии *E. coli*.

### Рекомендации по применению

Взрослым, первые три дня по 1 капсуле три раза в день во время еды, далее по 1 капсуле один раз в день.

Рекомендованный курс приема от 2 до 4 недель. Прием может быть продолжен по рекомендации врача.

*Применение при беременности:* возможно по рекомендации врача.

**Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.**

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость сои и других компонентов БАД.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Взаимодействия**

Сведения о несовместимости с лекарственными препаратами или пищевыми продуктами отсутствуют.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Упаковка**

По 12 мягких капсул в блистер. По 1, 2, 3 или 5 блистеров вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Условия реализации**

Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

**Свидетельство о государственной регистрации:**

№ KZ.16.01.98.003.E.001353.01.17 от 06.01.2017 г.

**Изготовитель:**

Медана Фарма Акционерное Общество

98-200 Серадз, ул. В. Локетка, 10, Польша

(адрес производства: 98-200 Серадз, ул. Польской Организации Войсковой, 57, Польша)

**Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей/ Импортер:**

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия

142450 Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Тел./факс: +7 (495) 702-95-03.

**ЕАС**